

3

THỨC ĂN VÀ CHO ĂN

- Ốc nhồi là loài ăn tạp thiên về thực vật; sử dụng thức ăn công nghiệp viên nổi đảm bảo độ đạm $\geq 20\%$.

- Tháng đầu tiên cho ăn thức ăn với lượng 5 - 6% tổng khối lượng ốc trong ao; từ tháng thứ 2 cho ăn 3 - 4% trọng lượng ốc trong ao; từ tháng thứ 4 đến khi thu hoạch cho ăn 2 - 3% trọng lượng ốc trong ao.

- Cho ăn 02 lần/ngày, thời gian cho ăn:

+ Sáng: 6 - 7 giờ

+ Chiều tối: 17 - 18 giờ




Lưu ý:

+ Thức ăn xanh để nguyên cả lá. Các loại lá cây có lông (lá bí, lá mướp,...) **KHÔNG CHO ĂN** vì dễ gây tổn thương cơ quan tiêu hoá, tạo điều kiện sinh vật gây bệnh xâm nhập.

+ Các loại củ, quả (mướp, bí, đu đủ, mít...) nên gọt bỏ phần vỏ phía ngoài và cắt thành từng miếng mỏng trước khi cho ốc ăn. Thức ăn còn thừa và thấy lên men, sủi bọt thì vớt ra ngoài.

+ Thức ăn tinh/thức ăn công nghiệp: Mỗi ngày chỉ cho ăn thức ăn tinh 1 lần chiếm khoảng 0,5 - 1,0% khối lượng ốc trong ao.

+ Các loại thức ăn phải biết rõ nguồn gốc, không chứa các loại hoá chất, thuốc bảo quản, ốc ăn vào dễ bị bệnh và chết.



Thức ăn của ốc nhồi

là thức ăn xanh, củ quả, phụ phẩm nông nghiệp

4

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

- Định kỳ 1 tháng thay nước 1 lần. Từ tháng nuôi thứ 3 trở đi, 2 tuần thay nước 1 lần, mỗi lần thay 30 - 35% lượng nước trong ao.

- Sử dụng chế phẩm sinh học để làm sạch môi trường ao nuôi, định kỳ 2 tuần/1 lần. Bổ sung khoáng và vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho ốc, hạn chế dịch bệnh.



Chất lượng màu nước ao nuôi

5

THU HOẠCH

- Sau 3 - 4 tháng nuôi, ốc đạt trọng lượng 25 - 30 con/kg thì thu hoạch. Tỷ lệ sống đạt 75 - 80%, năng suất đạt 5 - 6 tấn/ha.

- Phương pháp:

+ Thu tia: Dùng thuyền/vợt đi quanh bờ ao để bắt những con to (buổi sáng, buổi tối ốc thường nổi lên bám vào lá sắn, dễ bèo để ăn nên việc thu hoạch rất dễ).

+ Thu toàn bộ: Tháo cạn nước ao, bắt ốc bằng tay hoặc dùng cào để gom ốc.



Lưu ý:

Nên thu hoạch ốc trước mùa đông. Ở miền Bắc khi nhiệt độ dưới 12°C ốc sẽ chết hoặc phải có biện pháp trú đông cho ốc nhồi thương phẩm.

In: 2.000 bản, khổ 21cm x 29,7cm. Tại Cty CP in Ngọc Trâm, P 107 E8, TT Thanh Xuân Bắc, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Số xác nhận ĐKXB: 4170-2022/CXBIPH/05-141/HĐ
Số quyết định: 989/QĐ-NXBHĐ, cấp ngày 17/11/2022
In xong nộp lưu chiểu năm 2022
ISBN: 978-604-389-080-8

XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG BÁN



KỸ THUẬT NUÔI Ốc nhồi

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

📍 Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

☎ (024) 3771 5294 - (024) 3728 2481

🌐 www.khuyennongvn.gov.vn

1

CHUẨN BỊ AO NUÔI


- Nguồn nước sạch không có các loại hóa chất độc hại, cấp thoát nước thuận lợi. Diện tích ao phù hợp từ 1.000 - 2.500 m².
- Độ sâu mức nước trong ao 0,5 - 0,8 m. Bờ ao thiết kế cao hơn mức nước tối thiểu là 0,5 m.
- Đáy ao bằng phẳng, dốc về phía cống tiêu nước, rắc vôi bột với liều lượng 5 - 8 kg/100m².
- Kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp nước vào ao đảm bảo:
 - + pH: 7,0 - 8,5;
 - + Hàm lượng ô xy hòa tan ≥ 4 mg/l;
 - + Độ kiềm duy trì từ 70 - 120 mg/l;
 - + Nhiệt độ nước từ 22 - 30°C.

Chuẩn bị ao nuôi ốc nhồi

2

CHỌN VÀ THẢ ỐC NHỒI GIỐNG

- Chọn giống: Ốc nhồi giống có kích cỡ $\geq 0,5$ g/con, đồng đều, khỏe mạnh, không bị bệnh, không mòn vỏ, màu sắc tươi sáng.



Ốc nhồi giống

- Thả giống: Thả ốc vào lúc thời tiết mát (chiều tối hoặc sáng sớm). Mật độ thả nuôi trong ao là 50 - 60 con/m².

✓ **Lưu ý:** Thả ốc giống lên các vật nổi trên mặt nước ao (tầm xốp, lá chuối, vật liệu nổi khác,...) để ốc thích nghi dần với môi trường ao nuôi và tự bò ra ao. Không thả giống vào mùa đông.



Thả giống